

DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS

Continuando con la nutrición durante la lactancia de los lechones, se introduce un alimento con mayor contenido de cereales extruidos de fácil digestión, se mantiene una importante base de proteínas lácteas y lactosa, adicionalmente aislados y concentrados de proteínas animal y vegetal, para incrementar la producción endógena de enzimas digestivas.

Se suministra **ADIPIG FASE 0, JUMP START**, que es un alimento lactoiniciador altamente palatable, para continuar con la introducción de una alimentación sólida, el desarrollo de los órganos, y la producción enzimática digestiva. Se administra a partir del día 11 hasta el día del destete, permitiendo que el lechón incremente la ingesta de alimento sólido, complementando a la leche materna, para completar sus requerimientos nutricionales.

Un adecuado consumo de alimento sólido podría ayudar a: Preservar la condición corporal de la madre; mejorar la uniformidad de la camada, mucho más si es numerosa; Y a reducir la mortalidad en la fase de lactancia. Aunque los beneficios son visibles en lechones de madres múltiparas, estos se aprecian de mejor forma en las camadas de madres primerizas.

Se espera que en esta etapa los lechones ingieran al menos 400 g. de alimentos sólidos, aunque este valor pudiera incrementarse significativamente, dependiendo del estímulo que se dé por parte del operador.

ANÁLISIS NUTRICIONAL DEL NUTRIPAKET

NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR	NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR
PROT.BRUTA - Mín	%	21,00	HUMEDAD - Máx	%	12,00
LACTOSA -Mín	%	23,00	CALCIO	%	0,85
GRASA - Mín	%	6,00	FÓSFORO -Mín	%	0,60
E. METABOLIZABLE	Kcal/Kg	3,525.00	PROTEÍNA LACTEA - Mín	%	5,00

DOSIFICACIÓN

- Se recomienda la utilización de **ADIPIG FASE 0, JUMP START** “ad libitum” en lechones a partir del día 11 al destete. Es muy importante servir al comedero, al menos 3 veces al día, para que la oferta de alimento sea siempre fresca, y así conserve el aroma. Los comederos antes del servicio deben ser correctamente limpiados y desinfectados.
- Para hacer la transición durante el destete, es conveniente que el día del destete y traslado, los lechones coman una mezcla del alimento FASE 0 (75%) y el alimento FASE 1 (25%), el segundo día la mezcla se iguala al 50%, y al tercer día, se suministra solo el FASE 1.

PRECAUCIÓN Y MANEJO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores de los 30 °C.
- Almacenar en una bodega cuya humedad relativa se encuentre inferior a 65%.
- Vida útil: 6 meses.

PRESENTACIÓN

- Sacos 10 Kg.