



# ADIPIG FASE 1 JUMP STOUT

ALIMENTO  
LACTOINICIADOR PARA  
LECHONES  
POSTDESTETE, A PARTIR  
DEL DESTETE AL DÍA 32  
DE EDAD

## DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS

El inicio de la fase posterior al destete, está marcada por diferentes situaciones que estresan a los animales, una de las respuestas al nivel de estrés alcanzado, es la reducción del consumo. Por esa razón los alimentos de la línea **ADIPIG**, presentan una continuidad de sabores y aromas, así como medicamentos y aditivos, para que los animales no resientan los cambios de las raciones.

En esta etapa, el programa presenta una inclusión de nuevos ingredientes, en pequeñas cantidades. Se empieza la reducción de la participación de la base láctea, sin dejar de ser aún una importante inclusión. Cereales que serán la base de su alimentación posterior empiezan a ser introducidos, para completar el desarrollo enzimático, todos los cereales son extruidos.

**ADIPIG FASE1, JUMP STOUT**, es un alimento altamente palatable, desarrollado y formulado para que los lechones expresen todo su potencial genético con una alimentación sólida. Se administra a partir de la transición alimentaria al destete, hasta el día 32 de edad.

**ADIPIG FASE1, JUMP STOUT** Se espera que, durante esta etapa, los animales tengan un consumo de al menos 3,5 Kg., pero la ingesta es proporcional al incentivo que a través del manejo del alimento hagan los operadores de granja.

## ANÁLISIS NUTRICIONAL DEL NUTRIPAKET

NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR	NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR
PROT.BRUTA - Mín	%	19,50	HUMEDAD - Máx	%	12,00
LACTOSA -Mín	%	7,50	CALCIO	%	0,80
GRASA - Mín	%	5,00	FÓSFORO -Mín	%	0,60
E. METABOLIZABLE	Kcal/Kg	3,450.00	PROTEÍNA LACTEA - Mín	%	3,00

## DOSIFICACIÓN

- Se recomienda la utilización de **ADIPIG FASE1, JUMP STOUT** "ad libitum" en lechones a partir del destete al día 32 de edad. Es muy importante cumplir con una transición en la alimentación al destete, combinando los alimentos FASE 0, con el FASE 1. Se recomienda el día del destete, ofrecer una mezcla de alimento FASE 0(75%) con FASE 1 (25%), al día siguiente, la mezcla debe ser 50-50% de estos dos alimentos, y el segundo día post-destete, ya suministrar solamente el FASE 1.
- Ofrecer varias veces al día el alimento, ayuda a incentivar el consumo del producto, porque la oferta será siempre fresca, conservará los aromas a los que los lechones están familiarizados.

## PRECAUCIÓN Y MANEJO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores de los 30 °C.
- Almacenar en una bodega cuya humedad relativa se encuentre inferior a 65%.
- Vida útil: 6 meses.

## PRESENTACIÓN

- Sacos 25 Kg.