



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

adilisa.com





ADILISA

ADILISA

FABRICANTES DE
ADITIVOS PARA
**PRODUCCIÓN
ANIMAL**

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

ÍNDICE



ACUÍCOLA

5

Ácidos orgánicos	6
Antibióticos	6
Antiparasitarios orgánicos	7
Aportadores de oxígeno	7
Control de sabores	7
Desinfectantes de agua	8
Enzimas	9
Ligantes	9
Maduración	9
Prebióticos y probióticos	10
Promotores de crecimiento	13
Vitaminas y minerales	13



GRANJA

17

Acidificantes	18
Calcificantes	18
Complejos vitamínicos minerales	19
Detoxificantes	21

Funcionales	22
Lactoreemplazantes	26
Rehidratantes	28
Sales minerales	24



INDUSTRIA

29

Acidificantes	43
Antifúngicos	30
Antioxidantes	32
Atrapantes de micotoxinas	34
Bactericidas	36
Calcificantes	38
Enzimas	39
Funcionales	40
Pigmentantes	42

Iconografía de envases



Envase
Cilíndrico
300 g



Botella
1 L



Galonera
1 gal



Poma
20 L



Bidón
200 L



Envase
Cilíndrico/
Tambor
1 kg - 25 kg



Sobre
1 kg



Tacho/
Caneca
3 kg - 25 kg



Saco
10 kg - 25 kg



Mega
bidón
1000 kg



PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS | ACUÍCOLA



ÁCIDOS ORGÁNICOS



Ecocitro

Bactericida orgánico con efecto promotor de crecimiento e inmunoestimulante

ECOCITRO tiene acción bactericida a través de las sales y ácidos orgánicos, y de los extractos de plantas que posee en su formulación, los cuales permiten penetrar rápidamente la membrana celular de los microorganismos patógenos, debido a su fuerte actividad superficial, produce un desequilibrio osmótico en la célula bacteriana.



Composición	
Ácidos Orgánicos	Extractos de Plantas
Sales Orgánicas	Lactato de Calcio
Vitaminas	Pantotenato de Calcio
Betaglucanos	Butirato de Sodio
Nucleótidos	Excipientes
	Probióticos

Dosificación
Camarones: Preventivo de enfermedades: 2,5 - 3 kg/t de alimento balanceado. Inmunoestimulante: 1 - 2 kg/t de alimento balanceado. Curativo: 5 - 7 kg/t de alimento balanceado.
Peces: Preventivo y promotor de crecimiento: 2 kg/t de alimento balanceado.

ANTIBIÓTICOS



Florfen 15%

Antibiótico de amplio espectro

FLORFEN 15% es un antibiótico de Amplio espectro, formulado a partir de Florfenicol, molécula que está permitida por la FDA y por la Comunidad Europea para el tratamiento enfermedades bacterianas en animales acuáticos. FLORFEN 15% tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias gram negativas, patógenas, que causan enfermedades en las diferentes etapas del desarrollo del cultivo de peces tales como: género Vibrio sp, Pseudomonas sp, Aeromonas sp, entre otras.



Composición
Florfenicol
Dióxido de Silicio
Excipiente (Dextrosa Anhidra)

Dosificación
Planta: Vía alimento 2 - 3 kg/t por 10 días. Vía alimento 3 - 5 kg/t (Rickettsias) por 15 días.
Laboratorio de alevinaje: 2 - 3 ppm como tratamiento curativo.
Tiempo de retiro: 30 días antes de la cosecha.



Oxibind

Antibiótico de amplio espectro para acuicultura

Es un antibiótico de amplio espectro de larga acción para la prevención y tratamiento en procesos originados por bacterias Gram positivas, Gram negativas, en especial del género Rickettsia y Vibrio. El producto se absorbe a nivel intestinal, alcanzando su concentración máxima después de 2 - 4 horas de ser administrado. Destinado para camarones.



Composición
Oxitetraciclina 95 % HCL

Dosificación
Planta: 3 - 4 kg/t de alimento balanceado, para control de Vibrios. 5 - 7 kg/t de alimento balanceado, para control de Rickettsias.
Campo: 160 - 200 g por un saco de 40 kg de alimento balanceado para el control de Vibrios. 240 - 280 g por un saco de 40 kg de alimento balanceado para el control de Rickettsias.



ANTIPARASITARIOS ORGÁNICOS



Ecocitro GR



Antiparasitario orgánico para el control de infestaciones trofozoitos de gregarinas en camarones

ECOCITRO GR por su contenido sinérgico de ácidos orgánicos, sales orgánicas y extractos de planta especializados (con efecto antiparasitario), es un producto eficaz para el control de parasitosis en camarones. Debido a la sinergia de su componente, tiene un efecto directamente sobre la membrana celular de los trofozoitos, provocando una fuerte actividad superficial que produce un desequilibrio osmótico.

Composición	
Formiato de Calcio	Ácido Fumárico
Propionato de Calcio	Vitamina C
Ácido Cítrico	Butirato de Sodio
Ajo en Polvo	Aglomerante

Dosificación
Se recomienda su uso por 10 días consecutivos, alimentándolos al menos 2 veces al día y/o asesoramiento del Biólogo de planta, puede ser aplicado en etapa juvenil y de engorde.
Dosis en campo: 7 - 10 g/t de alimento balanceado.

APORTADORES DE OXÍGENO



Max O2



Booster aportador de oxígeno

MAX O2 es el producto ideal que ayuda a incrementar el oxígeno en el agua de una manera eficiente, rápida y prolongada, evita que se produzca caídas de oxígeno en los estanques evitando así la mortalidad por baja de oxígeno.

Composición
Percarbonato de Sodio
Excipiente

Dosificación
Camaronera Preventiva: 3 - 5 kg/ha, con lecturas de 2 ppm en la mañana. Correctiva: 5 - 8 kg/ha, con lecturas menor a 2 ppm en la mañana.
Laboratorio Preventiva: 2 g/t de agua del tanque con oxígenos menores a 4ppm. Correctivo: 4 - 6 g/t de agua del tanque con oxígenos menores a 2,5 ppm
Traslado de camarón 300 - 400 g/0,75 t de agua en bin, con Temperatura de 15 a 17 oC. Para transportar 500 lbs por 4 a 6 Horas.

CONTROL DE SABORES



Ajo en Polvo



Extracto de Ajo

El extracto de ajo o la molécula responsable del sabor y del olor característico e inconfundible del ajo, es la alicina. En un ajo intacto, la alicina se encuentra en concentraciones bajas, pero cuando el ajo se corta, o se tritura o se daña, la alicina se forma en cantidades abundantes. Lo que ocurre es que el cortado o aplastado del ajo liberan un enzima, la alinasa, que transforma a la alina, un compuesto inoloro presente en el ajo, en alicina y que es el compuesto responsable del sabor y del olor del ajo fresco. De 3 - 5 mg de alicina, equivalente a un diente de ajo o a 0,5 - 1 g de polvo de ajo.

Composición
Alicina
Vehículo C.s.p

Dosificación
Tratamiento de sabores: Camarones: 30 - 60 g/kg. Peces: 60 g/kg.
Control bacterias patógenas: Camarones: 10 - 20 g/kg. Peces: 20 - 30 g/kg.



DESINFECTANTES DE AGUA



Adisalm L

20 L

Bactericida orgánico para descontaminación de agua

Bactericida orgánico para la descontaminación de agua de laboratorios de larvas y tanques de raceways, prevención y control efectivo de bacterias, y hongos.

Composición		Dosificación
Ácido Fórmico	Ácido Propiónico	Preventivo: Nauplios 3 ppm. Zoeas 5 ppm. Mysis 7 ppm. Postlarvas 10 a 25 ppm. Curativo: Bajar carga bacteriana en agua del tanque de cultivo: Zoea 10 ppm. Mysis 15 ppm. Postlarvas 20 - 30 ppm.
Formiato de Amonio	Ácido Fórmico	
Ácido Fosfórico	Ácido Acético	
Ácido Láctico	Excipientes	



Fish Add L

20 L

Descontaminante y bactericida orgánico

Producto Orgánico para la descontaminación y control efectivo de bacterias, hongos y levaduras en los cuerpos de agua. Especialmente indicado para prevenir contaminaciones de producidas por bacterias, gram negativas y gram positivas y otras enterobacterias.

Composición		Dosificación
Ácido Fórmico	Formiato de Amonio	Descontaminante: Líquido, 4 - 5 L/ha. Preventivo: Líquido, 2 - 3 L/ha.
Ácido Láctico	Propionato de Amonio	
Ácido Propiónico	Excipientes	



Snail Cone X

20 L

Tratamiento desinfección de agua y tratamiento erradicar caracoles en piscinas acuícolas

Es una combinación sinérgica de ácidos orgánicos y sus sales, que actúa a través de los mecanismos de filtración de agua que tiene el molusco gasterópodo o caracol para su nutrición, provocando descompensaciones en su metabolismo que lo llevan a la destrucción del organismo, mediante una acción rápida y de alta efectividad.

Composición		Dosificación
Ácido Fórmico		Dosis infestación media: Hacer 1 aplicación de 20 L/ha, en solución al 25 %, directo a los caracoles con bomba de mochila, dejar actuar por 2 días y luego llenar, se recomienda el uso de probióticos al llenado debido a descomposición de los caracoles. Dosis infestación fuerte: Hacer 2 aplicaciones de 20 L/ha, en solución al 25 %, directo a los caracoles con bomba de mochila, dejar actuar por 1 día y repetir la dosis, luego llenar, se recomienda el uso de probióticos al llenado debido a descomposición de los caracoles.
Ácido Propiónico		
Agua		



ENZIMAS



Fullzyme Aqua

Paquete multienzimático para la elaboración de predigeridos



Es un paquete de diferentes tipos de enzimas especializadas, que actúan específicamente sobre el sustrato vegetal; éstos trabajan como es un catalizador biológico, el cual aumenta la velocidad de las reacciones químicas, de esta manera actúan simplificando los enlaces complejos de las estructuras de las cadenas orgánicas, difíciles de asimilar para los animales, transformándolos en monómeros que son más asimilables, siendo el resultado un producto "Predigerido".

Composición	
Xilanasa	Celulasa
Alfa-Galactosidasa	Proteasa
Beta-Glucanasa	Pectinasa
Beta-Mananasa	

Dosificación
1 kg/t de alimento balanceado.

LIGANTES



Ecobind

Ligante - attractante para alimentos peletizados



Es un aglomerante que permite ligar los productos en campo, además ayuda a alcanzar una mayor dureza física y mejores tiempos de hidroestabilidad a los alimentos pelletizados. ECOBIND conserva la identidad nutricional de los alimentos de acuicultura manteniéndolos estables bajo el agua, sin modificar su contenido nutricional ni la condición del agua de las piscinas, por los bajos niveles de inclusión en la fórmula.

Composición	
Dextrosa	Colorante rojo
Gomas vegetales	Aceite de pescado

Dosificación
10 g/L de agua, agitar vigorosamente en envase cerrado o usar licuadora vertical.
20 g/2 L de agua, agitar vigorosamente en un envase cerrado o usar una licuadora vertical. Esta preparación sirve para ligar 1 saco de alimento para camarones pelletizado de 25 kg.
Dejar secar por 2 - 3 horas y luego alimentar.

MADURACIÓN



Madurafer-T

Emulsión nutricional para camarones y peces en maduración



Es un producto utilizado en animales en reproducción para mejorar su supervivencia y fertilidad. Es principalmente un agente antioxidante en todos los procesos metabólicos de los animales. Está compuesto principalmente de vitaminas y minerales. El acondicionamiento metabólico permite reducir los efectos negativos del estrés del medio ambiente, confinamiento, hormonal-reproductivo, se usa para la prevención de enfermedades metabólicas, reducir mortalidad e incrementar la fertilidad, mediante la armonización del metabolismo. Emulsión con alto contenido de vitaminas y minerales, es un producto ampliamente utilizado para mejorar la fertilidad.

Composición	
Vitamina E	Extracto de Plantas
Selenio	Excipiente
Carotenoides	

Dosificación
Camarones reproductores: 3 - 5 ml/kg de alimento balanceado en etapa de maduración.
Peces reproductores: 5 - 10 ml/kg de alimento balanceado en etapa de maduración.



PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS



Adimos

Premezcla de prebióticos



ADIMOS es un premix que está compuesto de mananoligosacáridos y fructooligosacáridos, los cuales son prebióticos que se añaden a nuestra alimentación para mejorar la salud intestinal.

Composición	
Mananoligosacáridos	Lactato de Calcio
Fructooligosacáridos	Formiato de Calcio
B-Glucanos	Zinc
Propionato de Calcio	Cobre

Dosificación
1 - 2 kg/t de alimento balanceado. Vía Oral.



Liverkid Aqua

Prebiótico, hepatoprotector, antioxidante y digestivo



LIVERKID AQUA principalmente mejora la funcionalidad hepática, actúa como hepatoprotector, emulsificante, digestivo, antioxidante, prebiótico, colagogo, colerético, hipocolesterolemiante, hipotrigliceridemiante, inmunoestimulante y regenerador de los hepatocitos. Ha sido formulado para ser utilizado en peces que se encuentren bajo condiciones de estrés, desórdenes metabólicos, problemas digestivos, intoxicaciones e inmunosupresión en los que se busque mejorar la salud del animal y los parámetros de producción.

Composición	
Extracto de Cynara (Cynara Scolymus)	Lecitina de Soya
Silimarina	L-Carnitina
Aceite de Romero	Premezcla Vitamina Mineral (Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12, Pantotenato de Calcio, Ácido Fólico, Sulfato de Magnesio)
Cloruro de Colina	Dióxido de Silicio
Betaina	Maltodextrina
Metionina	Excipientes

Dosificación
1,0 - 1,5 kg/t de alimento balanceado.



Multibacter

Multiplicador biológico reemplazo al uso de melaza



Premezcla de hidratos de carbono, y nutrientes de altísima digestibilidad que permiten acelerar el desarrollo de microorganismos en cultivos bacterianos que son benéficos para el cultivo de camarones y peces. Sirve como sustituto o reemplaza al uso de melaza, se usa como para la activación de bacterias probióticas y/o reductoras de materia orgánica.

Composición	
Composición sinérgica de Hidratos de Carbono al 77 %	Minerales Trazas
Vitamina Complejo B, A Y C	Sílice Coloidal
Citrato de Sodio	

Dosificación
Para repiques de bacterias de 24 horas, utilice 2 - 3 kg/1000 L de agua.



Nucle-On

Nucleótidos de levadura



Está compuesto por nucleótidos provenientes de extractos de levaduras Non GMO, para uso en acuicultura, al ser un nutriente de alta asimilación, promueve el crecimiento y favorece la sobrevivencia de los animales en cultivo, además sirve como nutriente para la replicación de bacterias probióticas. NUCLEO-ON, produce una alta replicación celular de hemocitos, hematies, favorece la formación de nuevos tejidos, ayuda a la replicación de los enterocitos, que son células del epitelio por donde se absorben los nutrientes, agua y electrolitos.

Composición

Nucleótidos de Levaduras

DOSIFICACIÓN

Nutricional:

0,5 - 1,0 kg/1000 L de agua.

Activar probióticos:

1 - 2 kg/1000 L de agua.

Alimentar larvas, raceways, precriaderos:

5 - 10 kg/t de alimento.

En caso de eventos sanitarios, duplicar la dosis.

Se puede usar en camarones y peces.



Probi-On

Premezcla de probióticos



Premix de bacterias probióticas y saprófitas del tipo Gram +, aerobias y anaerobias, que resisten a temperaturas y pH ácidos las cuales promueven la exclusión competitiva inhibiendo el crecimiento de patógenos en el intestino del animal, también puede ser usado para bio-remediación de suelos de las piscinas. La sinergia de las bacterias contenidas en el PROBI-ON, ayudan el control de enfermedades y descomponiendo sustratos de desechos orgánicos reduciendo sedimentos del fondo del estanque.

Composición

Lactobacillus Acidophylus

Nitrobacterias

Bacillus Subtilis

Aspergillus Orizae

Bacillus Licheniformis

Levaduras

Dosificación

En alimento:

Larvicultura y raceways: 2 - 3 g/kg de alimento.

Camaronera: 2 kg/t de alimento.

En agua:

Dosis inicial: 200 g/100 L de agua/ha.

Mantenimiento: 150 g/100 L de agua/ha.

Activación de bacterias: Mezclar con 2 kg de melaza en 100 L de agua, y dejar activar por 24 horas.



Probi-On Nitro

Bacterias nitrificantes



PROBI-ON NITRO, es un premix de bacterias Nitrificantes capaces de remover eficientemente, acelerando los procesos de nitrificación, el amonio y los nitritos de los cuerpos de agua.

Composición

Premix Enzimático de Nitrozyme

Almidón de Maíz

Premix de *Bacillus Nitrobacterias* (*Nitrosomonas*, *Nitrosococcus*, *Nitrobacter*, *Nitrospina*, *Nitrospira* Y *Nitrococcus*)

Dióxido de Silicio

Dosificación

En estanques:

Uso Preventivo: 200 g/ha cada 30 días.

Uso Correctivo: 500 g/ha, debe ir verificando los niveles nitrogenados.

Larvicultura y raceways:

Uso Preventivo: 5 g/t cada 3 días.

Uso Correctivo: 15 g/t, debe ir verificando los niveles nitrogenados.



promegaBiotic f[®] OM



Tratamiento biorremediador
para suelos de piscinas acuícolas



Fabricado en E.E.U.U.

Composición

Cepas de microorganismos biorremediadores, nutrientes enzimas y medio de crecimiento bacteriano. 5 X 10⁹ ufc/gr

PELLET

Dosificación	
Granja semi-intensiva de camarón (sin aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1	150 g/semana
Semana 2	100 g/semana
Semana 3 hasta cosecha	70 - 200 g/semana
Granja intensiva de camarón (con aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1	250 g/semana
Semana 2	200 g/semana
Semana 3 hasta cosecha	150 - 400 g/semana
Granja semi-intensiva de peces (sin aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1 a 10	100 g/semana
Semana 11 a 22	200 g/semana
Semana 23 hasta cosecha	300 g/semana
Granja intensiva de peces (con aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1 a 10	250 g/semana
Semana 11 a 22	400 g/semana
Semana 23 hasta cosecha	1000 g/semana

ESFERAS

Dosificación	
Granja semi-intensiva de camarón (sin aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1	150 g/semana
Semana 2	100 g/semana
Semana 3 hasta cosecha	70 - 200 g/semana
Granja intensiva de camarón (con aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1	250 g/semana
Semana 2	200 g/semana
Semana 3 hasta cosecha	150 - 400 g/semana
Granja semi-intensiva de peces (sin aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1 a 10	100 g/semana
Semana 11 a 22	200 g/semana
Semana 23 hasta cosecha	300 g/semana
Granja intensiva de peces (con aireación) Dosis por hectárea:	
Semana 1 a 10	250 g/semana
Semana 11 a 22	400 g/semana
Semana 23 hasta cosecha	1000 g/semana





PROMOTORES DE CRECIMIENTO



Adit Power

Suplemento nutricional para camarones



Es un aditivo que actúa como suplemento en las dietas de camarón, el cual ha sido desarrollado específicamente para estimular el crecimiento en camarones de cultivo sometido a estrés. Contiene mega dosis de vitaminas protegidas. Contiene los elementos esenciales para el desarrollo del camarón que combina con los beneficios únicos de vitaminas, minerales, enzimas, ácidos orgánicos, antioxidantes, inmunoestimulantes, esteroides, atrayentes, entre otros.

Composición	
Vitaminas	Atractantes Naturales
Enzimas: Proteasas, Amilasas, Xilanasas, Etc.	Nucleótidos
Ácidos Orgánicos	Lactato de Calcio
Antioxidantes	Butirato de Sodio
Colesterol	Pantotenato de Calcio
Extracto de Plantas y Aceites Esenciales	Excipientes

Dosificación
Planta: 3 - 4 kg/t
Campo: 75 - 100 g/saco de 25 Kilos de alimento.
Laboratorio de larvas: 2 - 5 g/kg de alimento.

VITAMINAS Y MINERALES



Adimix Camarones

Premezcla vitamínica para camarón



Las vitaminas son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos esenciales para el mantenimiento, crecimiento, y reproducción de los camarones. ADIMIX CAMARONES, es una premezcla vitamínica para ser incorporada en alimentos balanceados para camarones en todas las etapas.

Composición	
Vitamina A	Vitamina B12
Vitamina D3	Niacina
Vitamina E	Pantotenato Calcio
Vitamina K3	Ácido Fólico
Vitamina B1	Biotina
Vitamina B2	Vitamina C Monofosfato
Vitamina B6	Inositol

Dosificación
Planta: 1,5 kg/t de alimento balanceado.
Camaronera: 2 - 3 g/kg de alimento balanceado.
Laboratorios de larvas: 1 - 3 g/kg de alimento de larvas de camarón por cada dosis.



Adimin Camarones

Premezcla mineral para camarón



Es un suplemento de vitaminas y minerales como parte de los requerimientos nutricionales por los camarones en pequeñas cantidades en su alimentación diaria, los cuales son esenciales para el mantenimiento, crecimiento, reproducción y mecanismos de defensa.

Composición	
Cobre	Yodo
Zinc	Selenio
Hierro	Cobalto
Manganeso	

Dosificación
Camaronera: 2 - 3 kg/t de alimento balanceado.
Laboratorios de larvas: 1 - 3 g/kg de alimento de larvas de camarón de dieta seca.



1 kg

COMPLEX B ACUA

PREMIX DE VITAMINAS

Las vitaminas son un complejo grupo de sustancias requeridas por los camarones y peces en pequeñas cantidades en su alimentación diaria, las cuales son esenciales para las distintas fases del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos en los que cada vitamina tiene su acción biológica específica. No se almacenan en el organismo por lo que requieren de consumo frecuente para conservar la saturación de los tejidos.

Composición	
Nucleótido	Niacina
Óxido de magnesio	Pantotenato de calcio
Fosfato monopotásico	Ácido fólico
Vitamina b1	Biotina
Vitamina b2	Vitamina c
Vitamina b6	Colesterol
Vitamina b12	Alfa galactosidasa
Vitamina k3	Cloruro de colina
Inositol	Dextrosa anhidra

Dosificación
Alimento de camarones y peces: 2 kg/t de alimento balanceado.
Larvas de camarón en dieta seca:
Zoea 1 a zoea 3: 2 - 3 g/kg.
Mysis 1 a mysis 3: 4 - 5 g/kg.
Pl 1 a pl 12: 6 - 7 g/kg.



PREMIX Vitamina C 35%

MONOFOSFATO



1 kg
25 kg

La Vitamina C o ácido ascórbico, es un nutriente esencial para el correcto funcionamiento fisiológico de los animales, el mismo que no es sintetizable por el organismo, por lo que se recomienda su ingesta como un suplemento vitamínico en peces y camarones; su función esencial es como potente antioxidante fisiológico intracelular. Cumple un papel importante en el mecanismo de defensa de los crustáceos y peces; su suplementación, ha demostrado ser muy necesaria en animales en cautiverio sometidos a constante estrés y además para la reproducción normal.

Composición

L-Ascorbic-2-Phosphate (Vitamina C Al 35 %)

Dosificación

Alimento de peces: 1,5 - 2 kg/t.

Alimento de camarones: 1 - 2 kg/t.

Laboratorios de larvas de camarón: 1 - 7 g/kg de alimento.

PREMIX Vitamina C 99%

CRISTALES



1 kg
25 kg

La Vitamina C (ácido ascórbico), es un nutriente esencial para el correcto funcionamiento fisiológico de los animales, el mismo que no es sintetizable por el organismo, por lo que se recomienda su ingesta como un suplemento vitamínico en alevines de peces y larvas de camarones.

Composición

Vitamina C

Excipiente (Ácido Cítrico)

Dosificación

Larvas:

3 ppm en la dosis diaria de larvas de camarón en todas las etapas.

Dosis para dechlorinación:

Relación 2 vitamina C cristales: 1 residual de cloro.



Biocal

Suplemento de Calcio, Magnesio y Potasio para camarones y peces



BIOCAL es un importante suplemento de Calcio de fácil asimilación para crustáceos y peces, durante las fases de crecimiento. La gran fuente de Calcio orgánico permitirá que se genere una estructura ósea secundaria en los peces y del exoesqueleto de los crustáceos, que servirá para cubrir las deficiencias de Calcio durante todo el período de desarrollo del animal.

Composición	
Formiato de Calcio	Premix Vitaminas
Citrato de Calcio	Premix Minerales
Lactato de Calcio	Vitamina C 35 % Monofosfato
Betaina Hcl	Colesterol
Ácido Glutámico	Oxido de Magnesio y Cloruro de Potasio
Fosfato Monodicalcico	Zeolita Blanca
Premix de Bicarbonato de Sodio	

Dosificación
Camarones: 2 - 3 kg/t de alimento balanceado Peces: 2 kg/t de alimento balanceado
Larvas de camarón: Preventivo: 1 - 3 g/t agua cada 6 horas. Curativo: 3 - 5 g/t agua cada 6 horas.



Equilibrium

Enmienda mineral



EQUILIBRIUM es una enmienda mineral con aporte de calcio altamente soluble, que permite estabilizar el balance iónico, que reducirá el estrés, incrementando la supervivencia y crecimiento de los camarones de cultivo, mejorando además su salud.

Composición	
Sulfato de calcio	Cloruro de magnesio
Lactato de calcio	Cloruro de potasio
Excipiente	

Dosificación
Larvas y postlarvas de camarones: Corregir deficiencia de Ca 2 - 3 ppm EQUILIBRIUM, por cada ppm de deficiencia a recuperar.
Raceway: Corregir deficiencia de Calcio 1 - 2 ppm EQUILIBRIUM, por cada ppm de deficiencia a recuperar.



PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS | GRANJA



ACIDIFICANTES



Acidif Aqua

Acidificante

25 kg

ACIDIF AQUA es una combinación de ácidos orgánicos y ácido clorhídrico para uso en el agua de bebida animal, que regula el pH intestinal con efectos antimicrobianos y digestivos. Estimula la flora benéfica, inhibe patógenos y mejora la absorción de nutrientes al optimizar la acción enzimática. También potencia antioxidantes, antibióticos y promotores de crecimiento, ayudando a prevenir diarreas y mejorar el rendimiento.

Composición		Dosificación
Propionato Amónico	Formiato Amónico	Lechones de 1 - 7 días 1 - 2 ml/L de agua, mezclar esta solución con 50 % de agua azucarada, y dar 10 ml. por lechón por día, con una jeringa.
Ácido Cítrico	Ácido Clorhídrico	Agua de Bebida Lechones: 1 - 2 L/1000 L de agua. Terneras 4 - 5 días después del calostro: 1 - 2 ml/L de agua, mezclar esta solución con 50 % de agua azucarada, y dar 50 ml. por ternera por día, con una jeringa.



Adimold Blue

Acidificante, Antifúngico, Bactericida

20 kg

200 kg

ADIMOLD BLUE es un acidificante para el agua de bebida con acción antifúngica, bacteriostática y bactericida. Contiene ácidos orgánicos volátiles que reducen el pH, inhibiendo hongos y bacterias patógenas. Actúa promoviendo la flora benéfica, mejorando la asimilación de nutrientes y sirviendo como promotor de crecimiento. Su fórmula incluye cobre, que estimula la producción de ácido clorhídrico, optimizando la digestión en el tracto gastrointestinal.

Composición		Dosificación
Ácido fosfórico	Propionato de amonio	Durante los 10 primeros días de vida: 1 L/1000 L de agua de bebida.
Sulfato de cobre	Formiato de amonio	
Ácido fórmico	Lactato de sodio	Unos días después de la última vacuna: 3 L/1000 L de agua de bebida por 3 días.
Ácido propiónico	excipientes	
Ácido málico		

CALCIFICANTES



Calcioral

Calcificante

1 gal

20 kg

Suplemento diseñado para vacas en fase de post parto, una etapa crítica caracterizada por alta demanda energética y mineral, y una menor capacidad de ingesta. Su fórmula avanzada ayuda a prevenir carencias nutricionales comunes en este período, especialmente en animales de alta producción o bajo estrés térmico.

Composición		Dosificación
Carbonato de Calcio	Betaína	Suministrar con pistola dosificadora o sonda esofágica 500 cc en los primeros síntomas del parto, 500 cc a las 12 horas del parto, o utilizando envases mono-dosis de 500 cc.
Ácido Clorhídrico	Ácido Glutámico	
Cloruro de Magnesio	Glicerina	Repetir dosis en animales que presenten síntomas de enfermedades metabólicas.
Goma Xantan	Propil Parabeno	
Colorante Amarillo	Saborizante	
Dextrosa	Metil Parabeno	



Calcioral GL

Calcificante



Suplemento de calcio orgánico altamente asimilable, diseñado para aves ponedoras durante las fases de pre-postura y pico de postura. Favorece la formación de reservas óseas secundarias, esenciales para mantener niveles adecuados de calcio durante la producción de huevos.

Composición	
Ácido Clorhídrico	Ácido Glutámico
Carbonato de Calcio	Cloruro de Colina
Benzoato de Sodio	Goma Xanthan
Fosfato Monocálcico	Vitamina D
Glicerina	Vitamina C

Dosificación
4 - 5 cc/L de agua de bebida.
1 gal/1000 L de agua de bebida.

COMPLEJOS VITAMÍNICOS MINERALES



Adivit

Vitaminas

1 kg

Producto con alto contenido de vitaminas que apoyarán la recuperación de los animales en los periodos de convalecencia, posteriores a eventos sanitarios o de estrés.

Composición	
Ácido fólico	Pantotenato cálcico
Vitamina C	Biotina
Vitamina B12	Vitamina K3
Vitamina B1	Vitamina E
Vitamina B6	Vitamina A
Vitamina B2	Niacina
Vitamina D3	Excipientes

Dosificación
1 kg/4000 L de agua de bebida para aves durante 5 a 7 días consecutivos.



Aminoadi

Vitaminas y Aminoácidos

1 kg

Aditivo nutricional ideal para aves, cerdos y conejos, con el objetivo de ser utilizado en situaciones de estrés con retraso en el crecimiento o bajas de producción, donde se requiera un mayor aporte de vitaminas, protectores hepáticos y aminoácidos, indispensables para la salud y productividad del animal.

Composición		
Aislado de soya	Vitamina E	Vitamina C
Nucleótido de levadura	Vitamina K3	Vitamina B6
Diatomita	Biotina	Vitamina B1
Niacina	Pantotenato de calcio	Vitamina B12
Vitamina A	Vitamina B2	Ácido Fólico
Cloruro de colina	Vitamina D3	

Dosificación
Realizar una predilución en 20 litros de agua caliente y dosificar de acuerdo a la especie.
En aves y cerdos: 1 kg/1000 L de agua de bebida durante 5 días.
Para conejos: 2 g/L de agua de bebida durante 7 días.



Hepaket

Suplemento nutricional

Suplemento vitamínico y energizante diseñado para compensar algunos efectos producidos por los cambios metabólicos y fisiológicos ocurridos en vacas lecheras durante el parto.

20 kg

Composición	
Vitamina A	Propilenglicol
Vitamina D3	Niacina
Vitamina E	Excipientes
Selenio orgánico	

Dosificación
Recomendado para vacas lecheras de alta producción, para ser usado como preventivo o para tratamiento de cetosis y/o síndrome de hígado graso.
Usar una dosis de 500 cc a los 7 - 8 días antes del parto. Usar días posteriores al parto, 2 días seguidos en dosis de 500 cc por la mañana y 500 cc por la tarde.
Para tratamientos usar 500 cc por la mañana y 500 cc por la tarde hasta la recuperación del animal.



Multiadivit

Vitaminas y Aminoácidos

Polvo hidrosoluble que asegura un aporte adecuado de vitaminas y minerales en periodos de nutrición insuficiente, estrés o de reabsorción intestinal disminuida.

3 kg

Composición		
Maltodextrina	Vitamina C	Vitamina D3
Dioxido de Silicio	Vitamina B2	Lactosuero de leche
Leche reengrasa	Pantotenato de calcio	Citrato de potasio
Tripolisfosfato de sodio	Vitamina K3	Selenio orgánico
Ácido fólico	Niacina	Yoduro potásico
Vitamina B12	Vitamina E	Manganeso orgánico
Vitamina B1	B.H.T	Zinc orgánico
Vitamina B6	Vitamina A	Hierro orgánico
Cobalto orgánico		

Dosificación
Destinado para aves, cerdos y bovinos en etapa inicial. Disuelva la cantidad requerida de MULTIADIVIT en el agua de bebida. Administrar una o dos veces al día durante una semana ininterrumpidamente.
Aves: 10g/400 L de agua para 500 pollitos.
Porcinos: 10g/400 L de agua para 20 lechones.
Bovinos: 10g/400 L de agua para 4 terneras.



Novacomplex B

Vitaminas

Compuesto de vitaminas del grupo B, que tienen fuerte incidencia en el crecimiento, reproducción y mal funcionamiento hepático.

Su uso se recomienda para el tratamiento en los casos de bajo consumo de alimento, alteraciones hepáticas, avitaminosis, bajos índices reproductivos y fertilidad.

1 L

Composición	
Vitamina E	Niacina
Vitamina K	Pantotenato Cálcico
Vitamina B1	Ácido Fólico
Vitamina B2	Biotina
Vitamina B6	Excipiente
Vitamina B12	

Dosificación
Suministrar junto con el agua de bebida limpia. 100 ml/500 L de agua.



Lipco

Suplemento nutricional



Premezcla de zinc orgánico que transforma el mineral orgánico para asegurar su completa asimilación y así participar con su presencia en los distintos procesos metabólicos del cuerpo del animal y puede ser utilizado como una fuente de zinc.

Composición	Dosificación
Zinc orgánico	Vacas: 30 g/animal/día.
Dextrosa Anhidra	Equinos: 20 g/animal/día.



CNT-100

Suplemento nutricional



suplemento nutricional de uso diario y a la vez es un corrector de problemas nutricionales en terneras, que manifiestan retraso en su desarrollo y crecimiento, muchas veces como consecuencia de procesos diarreicos previos, u otras enfermedades patológicas típicas en las primeras edades.

Composición	Dosificación
Suero dulce de leche	Sorbato de potasio
Fosfato monosódico	Fosfato dicálcico
Ácido cítrico	Vitamina C

Terneras recién nacidas empezar usando 20 g por toma (40 g/día) e ir progresivamente aumentando la cantidad hasta llegar a los 100 g/día.

En terneras enfermas 100 g/día, adicionando a la dieta diaria, o por periodos hasta el mejoramiento de los animales retrasados.

DETOXIFICANTES



Adisafe

Inmunoestimulante



ADISAFE es un suplemento integral diseñado para fortalecer el sistema inmune, mejorar la salud intestinal y apoyar el funcionamiento hepático en animales. Su fórmula combina ácidos orgánicos, probióticos, enzimas, extractos vegetales, aceites esenciales, vitaminas y minerales orgánicos, todo con un enfoque sinérgico y natural.

Composición		
Pared celular de levadura	Saccharomyces Cerevisiae	Betaina líquida
Premix Probióticos (Enterococcus, Lactobacillus)	Premezcla Vitamínica Mineral (Maltodextrina, Vitamina B12, Vitamina B1, Selenito monosódico, Ácido fólico, Vitamina B6, Zinc)	Premix de Enzimas (Alfa galactosidasa, Xilanasa, Beta glucanasa, Beta manasa, Celulasa, Pectinasa, Alfa amilasa bacterial)
Propionato de amonio	Ácido acético	Lecitina de soya
Ácido láctico	Extracto de Ajo 25 %	Dextrosa
Ácido propiónico	Clorofila	Formiato de amonio
Sulfato de cobre	Ácido fórmico	Cloruro de sodio
Extracto de cynara	Jarabe de equinácea	Sorbato de potasio
Cloruro de magnesio	Fosfato monosódico	Citrato de sodio
Ácido cítrico	Aqua	Aceite de orégano

Dosificación	
Administre vía oral a través del agua de bebida 1 L/ 1000 L de agua de bebida.	

Administre vía oral a través del agua de bebida 1 L/ 1000 L de agua de bebida.



Adisafe Powder

Inmunoestimulante

Contiene vitaminas especialmente las del complejo B, y fuentes orgánicas de minerales, indispensables para el correcto funcionamiento metabólico.

25 kg

Composición		
Electrolitos	Ácidos Orgánicos	Enzimas
Probióticos	Aceites Esenciales de Romero y Orégano	Extractos de Plantas, como: Cynara, Cardo, Clorofila Ajo, Equinacea
Mananooligosacáridos	Beta Glucanos	Colina
Betaina	Lecitina	Vitaminas
Minerales	Azúcares	

Dosificación
800 g/t de alimento balanceado.

FUNCIONALES



Adiensil

Conservante para ensilaje

ADIENSIL es un aditivo conservante para ensilaje de forrajes, formulado a base de ácido fórmico y formaldehído, diseñado para mejorar la fermentación y conservación del material ensilado, especialmente en forrajes difíciles como gramíneas y leguminosas.

20 kg

Composición
Ácido Fórmico
Excipiente

Dosificación
1 - 4 L/t de la dosis de acuerdo al tipo de ensilaje, usar una dosis mayor para ensilajes que contengan leguminosas y menores aplicaciones para gramíneas.



Adinido

Desinfectante

Desinfectante especializado para nidos de gallinas reproductoras, formulado con sales de ácidos orgánicos y paraformaldehído al 90 %, diseñado para controlar la contaminación bacteriana en los lugares de postura, donde se origina la mayor parte de la contaminación del huevo fértil.

25 kg

Composición
Propionato de calcio
Formiato de calcio
Paraformaldehído

Dosificación
Nidos: Cada 15 días aplicar 7 g por cubículo de nido en granjas de producción de gallinas reproductoras. Mezclar ADINIDO con cascarilla de arroz, y colocar en el nido. Usar la dosis indicada. Aplicado correctamente, no causa irritación de la cloaca, ni pérdida de emplume. Volver a aplicar la misma dosis cada 15 días. Cambiar la cascarilla mensualmente.
Camas de galpones: 3 kg/t de cascarilla de arroz a tratar. Colocar ADINIDO bajo la cascarilla de arroz, en un recinto cerrado, dejar actuar por 4 días.
Pisos de galpones: Espolvorear ADINIDO sobre el piso del galpón antes de colocar la cama. Una vez colocada la cama, cierre el galpón para permitir que los gases actúen, dejar al menos 3 - 4 días.



Adistres

Regulador del balance electrolítico

25 kg

Producto formulado para combatir el estrés calórico en aves de corral, especialmente en condiciones de altas temperaturas dentro de las naves avícolas.

Composición		Dosificación
Ácido acetilsalicílico	Cloruro de sodio	1 kg/1000 L de agua.
Vitamina C	Ácido Glutámico	
Ácido cítrico anhidro	Citrato de Potasio	



Adiyeast

Levaduras

25 kg

ADIYEAST es un aditivo basado en cepas específicas de *Saccharomyces cerevisiae*, que favorece la salud y eficiencia digestiva en rumiantes. Estas levaduras eliminan el oxígeno del rumen, estimulando el crecimiento de la microbiota benéfica y mejorando la absorción de nutrientes y minerales. Además, sus β -glucanos fortalecen el sistema inmune al estimular la producción de células defensivas como macrófagos y neutrófilos.

Composición	Dosificación
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> 2×10^{10}	5 - 10 g/animal/día, dependiendo de la productividad lechera. 90 - 250 g/t de alimento balanceado de vacas lecheras.



Di-Gestive

Regulador de Ph ruminal

25 kg

DI-GESTIVE es un regulador ruminal diseñado para prevenir la acidosis y optimizar la fermentación en rumiantes, especialmente en vacas lecheras. Su fórmula con óxido de magnesio actúa como tampón, manteniendo el pH ruminal entre 6,2 y 6,3 por hasta 12 horas, lo que mejora la digestión de la fibra y la absorción de nutrientes. Inhibe la producción excesiva de ácido láctico y AGV, favoreciendo la salud ruminal, aumentando el consumo de alimento y mejorando los parámetros productivos, especialmente en vacas en pre y post-parto.

Composición	Dosificación
Sesquicarbonato de Sodio	Administrar durante el inicio de la lactancia por el cambio de dieta alta en forraje a concentrado más forraje. Dosificar el 1 % del total de alimento balanceado ingerido en cada ordeño. Dosis alternativa: Dosificar por vaca/día, de acuerdo a lo siguiente: Por 2,5 kg de alimento balanceado, administrar de 25 - 40 g. Por 5 kg de alimento balanceado, administrar de 50 - 75 g. Por 7,5 kg de alimento balanceado, administrar de 75 - 115 g.
Óxido de Magnesio	
Excipientes (Carbonato de Calcio)	



Grasetto Energy

Palma Saponificada

25 kg

Este aditivo mejora la producción y calidad de leche y carne, previene enfermedades metabólicas por déficit energético y aumenta la fertilidad hasta en un 20 %. Ofrece alta apetencia, no tiene restricciones de uso y no afecta la microflora ruminal, evitando el timpanismo.

Composición

Ácido palmítico

Ácido esteárico y oleico

Saborizantes naturales a base de esencias vegetales cenizas

Dosificación

Producción de carne: Terneros de 1,5 - 3 % del total diario de la ración según edades.

Vacas láctea: 2 - 4 % del total de la ración.



Vitamina E+SE

Complejo antioxidante

1 L

Este suplemento combina vitamina E y selenio, esenciales para la actividad de la enzima glutatión peroxidasa, que protege a los animales del daño oxidativo. Su uso previene trastornos neuromusculares y metabólicos inespecíficos como encefalomalacia, distrofia muscular y temblores. Además, actúa como precursor de la neoglucogénesis, favoreciendo el aprovechamiento de las reservas energéticas en animales de engorde.

Composición

Selenio

Ácido Propiónico

Vitamina E

Aceite de Ricino

Alcohol Bencílico

Propilenglicol

Aceite de Orégano

Glicerina

Cloruro de Colina

Dosificación

Todas las especies terrestres:

1 L/1000 L de agua de bebida.

No exceder la dosis recomendada.

Retirar el producto cuando los síntomas hayan desaparecido.

SALES MINERALES



Adijet

Sales minerales

25 kg

Complemento nutricional para vacas lecheras y ganado de ceba. Contiene un aporte de trazas minerales, levaduras y grasas sobrepasantes del rumen. Busca mejorar la producción lechera de vacas, las ganancias de peso corporal en animales de ceba, especialmente en pastoreo, con escaso o ningún suministro de alimento balanceado, también utilizado para mejorar el estado corporal de los animales.

Composición

Grasa Vegetal

Yucca Schidigera

Sulfato de Cobalto

Fitasa

Sulfato de Zinc

Óxido de Magnesio

Extracto de Levadura

Sulfato de Manganeseo

Sulfato de Hierro

Sulfato de Cobre

Yoduro Potásico

Carbonato de Calcio

L- Carnitina

Selenito Sódico

Zeolita

Dosificación

Se recomienda el uso de ADIJET durante el primer tercio de lactación, hasta 10 días después del pico de lactancia.

En vacas con altos niveles de producción de leche, seguir suplementando sal mineral, para que el aporte de sales minerales del ADIJET mejore los índices reproductivos.

Vacas con escaso o ningún suministro de alimento balanceado: 250 - 300 g/animal/ día.

Suministrar directamente en la sala de ordeño, junto al alimento balanceado.

Para ganado de ceba: 100 - 150 g/animal/día.



Supersal

Sales minerales

Premezcla saborizada de minerales para uso diario en alimentación de ganadería de leche y carne. SUPERSAL cubre los requerimientos de minerales de todas las razas de rumiantes, posee una muy buena apetencia por su sabor.

20 kg

Composición		
Fosfato Monodicalcico	Sulfato de Cobre	Sulfato de Zinc
Sulfato de Cobalto	Azufre	Sal
Yoduro de Potasio	Sulfato de Manganeseo	Excipientes
Selenito Sódico	Carbonato de Magnesio	

Dosificación
Suministrar SUPERSAL con el alimento balanceado, o colocándolo en el comedero a libre consumo en potreros.
Vacas lecheras: 100 - 150 g/animal/día.
Ganado de carne: 100 - 150 g/animal/día.
Terneras, vaconillas, vaconas: 20 - 75 g/animal/día.



Supersal Plus

Sales minerales

Premezcla saborizada de minerales para uso diario en alimentación de vacas lecheras de alto rendimiento. SUPERSAL PLUS cubre los requerimientos de minerales de todas las razas de rumiantes, posee una muy buena apetencia por su sabor.

20 kg

Composición		
Zeolita	Fosfato dicálcico	Azufre
Sulfato de hierro	Yoduro de potasio	Sulfato de cobre
Carbonato de calcio	Sulfato de cobalto	Sulfato de zinc
Fosfato monodicalcico	Selenito sódico	Sal
Carbonato de magnesio	Sabor rumiante	Sulfato de manganeseo

Dosificación
Vacas lecheras: 50 - 100 g/animal/día.
Terneras, vacunillas y vaconas: 25 - 50 g/día.



Supersal Vit

Sales minerales

SUPERSAL VIT está formulado de acuerdo con los requerimientos de todas las razas de bovinos lecheros y de ceba, es una premezcla muy apetente saborizada que cuenta con todos los minerales, oligoelementos y vitaminas que necesitan los rumiantes para el buen funcionamiento metabólico.

25 kg

Composición		
Fosfato dicálcico	Sulfato de cobalto	Azufre
Zeolita	Vitamina E	Sulfato de cobalto
Sal	Selenito sódico	Sulfato de manganeseo
Yoduro potásico	Vitamina A	Zinc orgánico
Ácido nicotínico	Manganeseo orgánico	Oxido de hierro rojo
Vitamina D3	Sabor rumiante	Sulfato de zinc
Selenio orgánico	Hierro orgánico	Carbonato de magnesio

Dosificación
Vacas lecheras: 100 - 150 g/animal/día.
Vacas lecheras con bajos índices reproductivos: 150 g/animal/día, durante 21 - 30 días.
Terneras, vaconillas y vaconas hasta primer parto: 50 - 100 g/animal/día.
En alimentos balanceados para bovinos: 1 - 2 % según el tipo de alimento balanceado.
Equinos: 50 g/día de corrido.



LACTOREEMPLAZANTES



HOGLAC

LECHE PARA
LECHONES

SILVERCalf

LACTOREEMPLAZANTE
PARA TERNERAS

GOLDENCalf

LACTOREEMPLAZANTE
PARA TERNERAS

✓ Menor desgaste hacia las madres

✓ Excelente palatabilidad



Para diluir en agua tibia



Hogslac

Lactoreemplazante

10 kg

Sustituto de leche para lechones, con el objetivo que el lechón no deje de tomar leche de la madre, sino que sea una alternativa de autorregulación. Es ideal para animales con bajo peso al nacer, débiles o camadas grandes donde exista riesgo de malnutrición, se recomienda suministrar en forma de papilla para mejorar el peso, condición corporal e incentivar el consumo del alimento balanceado. Puede ser utilizado como lactoreemplazante en cerdas que presenten problemas en el período de lactancia como agalaxia o mastitis.

Composición	
Lactosuero Dulce	Premezcla vitamínica mineral
Lactosuero reengrasado	Tripolifosfato de sodio
Concentrado de proteína de leche	B.H.T
Azúcar	Sabor a Vainilla
Suero de leche	Ácido cítrico

Dosificación
Para incentivar el consumo del alimento balanceado, mezclar 50 % de HOGSLAC con el alimento pre-inicial durante 2 o 3 días. HOGSLAC como lacto-acompañante: 200 g/L de agua, realizar primero una papilla con una pequeña cantidad de agua (no calentar a temperaturas superiores a 42 °C), agitar y agregar el resto del agua hasta obtener uniformidad. Colocar ad libitum.



Silver Calf

Lactoreemplazante

20 kg

Lactoreemplazante de la leche de vaca para uso en terneras, proporciona el nivel de energía y proteínas requerido para desempeñar las funciones de desarrollo y crecimiento. Enriquecido con vitaminas, minerales y promotores de crecimiento que permiten un mejor uso de nutrientes y una mayor resistencia a las enfermedades. Incluye saborizante con excelente palatabilidad que garantiza su consumo.

Composición		
Vitamina A	Hierro	Fósforo
Vitamina E	Magnesio	Manganeso
Calcio	Yodo	Cobre
Lisina	Vitamina B	Cobalto
Zinc	Metionina	Selenio

Dosificación
100 - 125 g/L de agua. No exceder la dosis recomendada.



Golden Calf

Lactoreemplazante

20 kg

Lactoreemplazante de la leche de vaca para uso en terneras, proporciona el nivel de energía y proteínas requerido para desempeñar las funciones de desarrollo y crecimiento. formulado con proteínas lácteas y vegetales de alta digestibilidad. La fuente energética proviene de grasa de leche, enriquecido con vitaminas, minerales y promotores de crecimiento que permiten una adecuada utilización de nutrientes y mayor resistencia a cuadros infecciosos.

Composición		
Vitamina A	Hierro	Fósforo
Vitamina E	Magnesio	Manganeso
Calcio	Yodo	Cobre
Lisina	Vitamina B	Cobalto
Zinc	Metionina	Selenio

Dosificación
100 - 125 g/L de agua. No exceder la dosis recomendada.



Lactorumen 10%

Premezcla lacteada

25 kg

Premezcla lactea utilizada en la alimentación de terneras en la fase inicial, tanto pre destete como post destete. Es un producto desarrollado para ser incorporada directamente en la elaboración del alimento balanceado inicial de terneras.

Composición	
Fosfato dicálcico	Ácido cítrico
Harina de soya	Suero de leche
Suero reengrasado de leche	Vitamina C

Dosificación
El alimento de preinicio elaborado con este núcleo se utiliza en el arranque de terneras desde los 8 - 12 días de vida, hasta los 100 kg de peso vivo o días después del destete de terneras. Los primeros días incentivar el consumo restregando con un pequeña cantidad de LACTORUMEN 10 % el morro de los animales. Mantener el alimento por lo menos 8 días después del destete. Dosis recomendada 30 g/animal/día.

REHIDRATANTES



Vitagel

Rehidratante

4 kg

Aportador de electrolitos, previene la deshidratación de los pollitos y la consecuente mortalidad durante el traslado. Su ingesta supone una fuente de alimento que favorece la secreción de enzimas pancreáticas en las primeras horas de vida.

Composición		
Cloruro de Magnesio	Dextrosa Monohidratada	Vitamina B12
Citrato de Sodio	Vitamina A	Vitamina C
Fosfato Monosódico	Vitamina D3	Excipientes
Glicerina	Vitamina E	
Ácido Cítrico	Vitamina B1	

Dosificación
60 g de VITAGEL en cajas diseñadas para 100 pollitos. Auméntese la dosis en función del tiempo, distancia de transporte y temperatura.
Repetir la dosis a la llegada a la granja junto con la primera dosificación de alimento balanceado.



Vitahidralip

Rehidratante

2,5 kg

25 kg

Premezcla con efectos de rehidratación, reforzamiento del sistema inmunológico, energizante y regulador electrolítico del aparato digestivo para cerdos, aves, ganado y otras especies animales.

Composición	
Dextrosa	Sorbato de Potasio
Ácido Málico	Excipientes

Dosificación
Recepción o arranque: 1 kg/400 L de agua durante los primeros 10 días.
Condiciones de estrés: 1 kg/4000 L de agua durante el período de estrés.
Diarreas y enfermedades: 1 kg/400 L de agua hasta su restablecimiento.
Traslado de aves y cerdos: 1 kg/1000 L de agua para reducir mermas de peso y el estrés del transporte.
Terneras: 50 - 100 mg/L de agua, por dos o tres tomas al día dependiendo del grado de deshidratación.



PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS | INDUSTRIA



ANTIFÚNGICOS



ADIMOLD PET | ADIMOLD | ADIMOLD L

ANTIFÚNGICOS

- ✓ Inhibe la reproducción de hongos.
- ✓ Prolonga la vida útil del alimento y cereales.
- ✓ Preserva su calidad y valor nutricional.



Adimold

Antifúngico

25 kg

Innovador antifúngico de alta eficacia para alimentos balanceados, que combina sinérgicamente ácido propiónico y sus sales con otras sales de ácidos orgánicos, todo contenido en un medio inerte que preserva los ingredientes sin interactuar con ellos. Esta formulación permite una liberación rápida y continua del ácido, tanto en su forma libre como en sales, asegurando un efecto prolongado.

Composición	
Ácido Propiónico	Propionato Sódico
Propionato Cálcico	Excipiente
Propionato Amónico	

Dosificación
En alimentos con humedad hasta del 12,5 %, se recomienda usar 1 kg/t.
En alimentos que se hacen para climas secos, se recomienda usar 0,5 kg/t.



Adimold L

Antifúngico

20 L

200 L

Antifúngico líquido de alta eficacia, formulado con una combinación sinérgica de ácidos orgánicos para el tratamiento y conservación de cereales y alimentos concentrados. Actúa directamente contra *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.* y *Fusarium spp.*

Composición	
Propionato de Amonio	
Agua	

Dosificación
En cereales usar 1 L/t.
Para periodos largos de almacenaje, repetir la aplicación cada tres meses para climas tropicales.



Adimold Pet

Antifúngico

25 kg

Antifúngico de alto poder inhibidor para alimento balanceado de mascotas. Formulado con una combinación sinérgica de ácido propiónico y sus sales en un medio inerte que preserva los ingredientes sin interacción, permitiendo una liberación rápida y continua del ácido, tanto en su forma libre como en sales.

Composición	
Ácido Propiónico	Propionato de Amonio
Di-Propionato de Amonio	Dióxido de Silicio
Propionato de Calcio	Surfactantes

Dosificación
1 - 2 kg/t de alimento balanceado de mascotas.



ANTIOXIDANTES



Greenox 20

Antioxidante líquido para aplicaciones en harinas de origen animal, aceites y alimentos

Antioxidante líquido con 20 % de B.H.T. (Butilhidroxitolueno), de acción prolongada y alta resistencia a temperaturas elevadas. Ofrece una protección antioxidante eficaz por largos periodos, ideal para harinas de pescado, harinas de origen animal, materias primas grasas, aceites y alimentos concentrados. Previene la oxidación y protege frente a sus efectos destructivos.



Composición

B.H.T.

Aceite de Girasol

Dosificación

Cada cliente debe desarrollar, mediante un estudio, la dosis óptima de aplicación.

El cliente puede partir desde la siguiente dosis para su estudio:
1,20 - 6 L/t del producto a tratar.



Greenox 40

Antioxidante líquido para aplicaciones en harinas de origen animal, aceites y alimentos

Antioxidante líquido formulado con dos antioxidantes primarios, de acción prolongada y alta resistencia a temperaturas elevadas. Su presentación líquida permite una fácil aplicación y óptima homogenización, asegurando una protección antioxidante inmediata y sostenida en el tiempo.



Composición

B.H.T

B.H.A

Aceite de Girasol

Dosificación

Cada cliente debe desarrollar, mediante un estudio, la dosis óptima de aplicación.

El cliente puede partir desde la siguiente dosis para su estudio:
0,85 - 4 L/t del producto a tratar.



Greenox AB

Antioxidante líquido para aplicaciones en harinas de origen animal, aceites y alimentos

Antioxidante líquido compuesto por dos potentes antioxidantes primarios, desarrollado especialmente para la industria animal como una alternativa eficaz al etoxiquin. Ideal para su uso en harinas de origen animal, incluyendo harinas de pescado, aceites y alimentos concentrados.



Composición

B.H.T

B.H.A

Aceite de Girasol

Dosificación

Para su uso mezclar de manera homogénea con el alimento a tratar.

Harinas de Pescado: 2850 - 4000 cc/t.

Aceite de Pescado: 1500 - 2000 cc/t.

Alimentos Balanceados: 100 - 150 cc/t.



Adoxine

Antioxidante

Combinación sinérgica de antioxidantes primarios y secundarios que previenen la formación de peróxidos, cetonas y aldehídos en los alimentos, productos derivados de la oxidación de grasas y aceites.

25 kg

Composición	
Etoxiuina	Fosfato Monosódico
B.H.T (Butil hidroxitolueno)	Excipiente
Ácido cítrico	

Dosificación
Mezclar homogéneamente según el grado o riesgo de oxidación de la materia a trabajar a razón de: En alimentos con grasas hasta del 8 % se recomienda usar 125 - 200 g/t para todas las especies.



Adoxine L

Antioxidante

Combinación sinérgica de antioxidantes primarios y secundarios que previenen la formación de peróxidos, cetonas y aldehídos en los alimentos, ofreciendo protección prolongada y garantizando la conservación óptima de los nutrientes.

18 kg

180 kg

Composición	
Etoxiuina	Ácido fosfórico
B.H.T (Butil hidroxitolueno)	Excipiente
Ácido cítrico	

Dosificación
Aceite de Palma: 0,9 L/t.
Aceite de Soya y Girasol: 1,7 L/t.
Aceite de Pollo: 1,5 L/t.
Alimentos Balanceados 8 % de Grasas: 0,1 L/t.
Subproductos de Rendering Bovino: 0,7 L/t.



Adoxine SE

Antioxidante

Combinación sinérgica de antioxidantes primarios y secundarios que previenen la formación de peróxidos, cetonas y aldehídos en los alimentos. Libre de Etoxiuina.

25 kg

Composición	
B.H.A	Fosfato Monosódico
B.H.T (Butil hidroxitolueno)	Excipiente
Ácido cítrico	

Dosificación
Para su uso mezclar de manera homogénea en el alimento balanceado y/o materia prima a tratar.
Balanceados para animales (peces, camarón): 125 - 300 g/t.
Materia prima: grasas > 10 % 1,5 kg/t.



ATRAPANTES DE MICOTOXINAS

ADILISA

GUARDIAN

ATRAPANTE DE MICOTOXINAS / MYCOTOXIN BINDER

PREMIUM QUALITY
CALIDAD PREMIUM
PRODUCTO DE EXPORTACIÓN
EXPORT PRODUCT

PESO NETO / NETWEIGHT
25Kg.

CONOCE TODA LA
FAMILIA **GUARDIAN**

GUARDIAN
GUARDIAN **FIX**
GUARDIAN **Z**

GUARDIAN

ATRAPANTES DE MICOTOXINAS

- ✓ Alta potencia de adsorción de amplia gama de micotoxinas.
- ✓ Efecto inmunoestimulante y hepato protector.
- ✓ Mitiga efectos negativos de las micotoxinas.



Guardian

Atrapante de micotoxinas

Es un compuesto atrapante de micotoxinas producidas por hongos como *Aspergillus spp.* y *Fusarium spp.*, comunes en cereales y oleaginosas. Está formulado con arcillas purificadas cuyas micropartículas, cargadas electrostáticamente, adsorben las micotoxinas mediante un intercambio catiónico, formando un enlace estable que impide su absorción en el tracto digestivo.

25 kg

Composición

Aluminosilicato Sódico Cálculo Hidratado

Zeolita

Dosificación

Para alimentos balanceados con un alto riesgo de contaminación y condiciones desfavorables de almacenaje (temperatura y humedad elevada) utilizar 5 kg/t.

Para Alimentos balanceados con un bajo riesgo de contaminación y condiciones desfavorables de almacenaje (temperatura y humedad normales) utilizar 2,5 kg/t.



Guardian Fix

Atrapante de micotoxinas con efecto inmunoestimulante

Es un atrapante de micotoxinas e inmunoestimulante, formulado con un refinado paquete de arcillas, pared celular de levaduras, extractos vegetales y aceites esenciales. Su acción secuestrante permite una alta adsorción de micotoxinas producidas por *Fusarium spp.*, como Zearalenona, T2 y Tricotecenos. Además, los β -glucanos, extractos de plantas y aceites esenciales actúan como inmunoestimulantes, al ser reconocidos por el sistema inmune como agresores no dañinos, fortaleciendo así las defensas del animal.

25 kg

Composición

Aluminosilicato Sódico Cálculo Hidratado

Levadura

Dosificación

Preventivo:
1 - 1,5 kg/t de alimento.



Guardian Z

Atrapante de micotoxinas con multiples mecanismos de acción, inmunoestimulante, protector hepático

Se utiliza para la prevención de cualquier nivel de contaminación por micotoxinas en todas las especies animales. Preserva el sistema inmunológico al reducir el desgaste causado por la eliminación de estas toxinas, y mejora la función intestinal mediante la regulación del equilibrio iónico. En casos de alta contaminación, se recomienda aumentar la dosis para potenciar su efecto protector.

25 kg

Composición

Montmorillonita

Dosificación

Modo preventivo:
Para atenuar los impactos negativos de las micotoxinas dosificar de 1 kg/t.
En las raciones para la etapa de reproducción se recomienda dosificar 1,5 kg/t.

Modo curativo:
En las raciones alimenticias que se presuma de contaminación con micotoxinas, aplicar 1,5 kg/t.
En las raciones alimenticias en etapa de reproducción que se presuma de contaminación con micotoxinas, aplicar 2,0 kg/t.



BACTERICIDAS



Adimold 70

Conservante, descontaminante y bactericida

25 kg

Bactericida sin formaldehído, formulado con ácidos orgánicos para la descontaminación, prevención y control de bacterias, hongos, levaduras y otros microorganismos en harinas de origen animal, como vísceras, carne, huesos y materias primas. Actúa eficazmente contra bacterias Gram positivas y negativas, incluyendo *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*. Ampliamente utilizado en la descontaminación de harinas de pescado y en líneas de producción.

Composición	
Formiato de Calcio	Ácido Cítrico
Ácido Fórmico	Ácido Málico
Propionato de Calcio	Excipiente

Dosificación
Descontaminante: 2 - 4 kg/t en el alimento balanceado y/o materia prima a tratar.
Preventivo: Para ser usado en el alimento balanceado y/o materia prima, dosificar de 3 - 4 kg/t en el producto a tratar.
Para limpieza de la línea de producción: Hacer una mezcla con 1 t de un vehículo (subproducto) con 50 kg de ADIMOLD 70 y recorrer la línea por varias ocasiones.



Adimold L 70

Bactericida, descontaminante y conservante líquido orgánico para productos o subproductos de pesca

20 L 200 L 1000 L

Bactericida especializado en la descontaminación, prevención y control de bacterias, hongos, levaduras y otros microorganismos en pesca fresca, harinas de origen animal, vísceras, carne, huesos y materias primas. Su formulación a base de ácidos orgánicos actúa eficazmente contra bacterias Gram negativas y positivas, como *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*. Es ampliamente utilizado en la descontaminación de harinas de pescado y en líneas de producción.

Composición	
Ácido Fórmico	Ácido Láctico
Ácido Propiónico	Propionato de Amonio
Formiato de Amonio	Excipiente (Agua)

Dosificación
Depende del grado de contaminación: 5 - 8 L/t.
Preventivo: 1 - 2 L/t de subproductos de animales acuáticos recién procesados. Realizar una pre-dilución al 10 %. Aplicar 1 - 3 L/t de pesca fresca, 3 - 4 L/t de subproductos de pesca. 2 - 3 L/t en harinas de origen animal recién procesadas. Para concentrado de pescado, 8 L/t Aplicar a la salida, con el concentrado a temperatura superior a 40 °C.
Aplicaciones : Sobre pesca fresca, o subproductos recién procesados, pueden requerir de diluciones del ADIMOLD L 70, si el producto a tratar no está en un medio acuoso que permita el contacto. Otras aplicaciones consulten al distribuidor.



Fish Add

Conservante, descontaminante y bactericida

25 kg

Bactericida formulado con ácidos orgánicos, diseñado para descontaminar y controlar bacterias, hongos y otros microorganismos en harinas de origen animal, como vísceras, carne y huesos. Es eficaz contra bacterias Gram positivas y negativas, incluyendo *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*. Se utiliza comúnmente en la descontaminación de harinas de pescado y en procesos de producción.

Composición	
Ácido fórmico	Ácido láctico
Ácido propiónico	Excipiente (Carbonato de calcio)
Dióxido de silicio	

Dosificación
Como descontaminante: 2 - 4 kg/t.
Preventivo: 2 - 3 kg/t del producto a tratar.
Para limpieza de la línea de producción: Hacer una mezcla de 1 t de un vehículo (subproducto) con 50 kg de FISH ADD y recorrer la línea por al menos 2 ocasiones.



Fish Add L

Conservante, descontaminante y bactericida líquido



Bactericida formulado con ácidos orgánicos para descontaminar y controlar bacterias, hongos, levaduras y otros microorganismos en harinas de origen animal (vísceras, carne, huesos). Eficaz contra bacterias Gram negativas y positivas, como *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*. Ideal para harinas de pescado y procesos en líneas de producción.

Composición	
Ácido Fórmico	Propionato de Amonio
Ácido Propiónico	Ácido Láctico
Formiato de Amonio	Excipiente (Agua)

Dosificación
Descontaminante: 5 - 8 L/t de alimento balanceado.
Preventivo: 1 - 3 L/t de pesca fresca. 3 - 4 L/t de subproductos de atún. 2 L/t de scrap semi-húmedo de pesca. 2 - 3 L/t para harinas de pescado. Solubles de pescado y concentrados 15 L/t o hasta llegar a un pH de 5,5.



Adisalm

Bactericida



Descontaminante de uso continuo en alimentos concentrados, efectivo contra bacterias Gram negativas y Gram positivas, incluyendo *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*.

Composición	
Propionato de Calcio	
Formiato de Calcio	
Carbonato de calcio	

Dosificación
3 - 4 kg/t de alimento balanceado para reproductoras.
2 - 3 kg/t de alimento balanceado para ponedoras.
1 kg/t de alimento balanceado en general.
3 - 5 kg/t para descontaminar alimentos o materias primas.



Adisalm L

Bactericida



Descontaminante líquido de uso continuo en alimentos concentrados, recomendado para el control de bacterias Gram negativas y Gram positivas, con eficacia comprobada contra *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*.

Composición	
Ácido Fórmico,	Ácido Láctico
Formiato de Amonio	Ácido Propiónico
Propionato de Amonio	Excipiente
Ácido Fosfórico	

Dosificación
ADISALM L se aplica mezclado en el alimento o en las harinas de origen animal.
3 - 4 L/t para aplicaciones preventivas de origen animal.
5 - 8 L/t para aplicaciones de descontaminación de harinas de origen animal.
1 - 2 L/t para aplicaciones preventivas en alimentos para animales.



Adisalm G

Bactericida

Antifúngico, bacteriostático, bactericida y acidificante formulado para descontaminar el tracto digestivo de gallinas ponedoras y reproductoras. Eficaz contra bacterias Gram negativas y positivas, incluyendo *Salmonella spp.* y *Escherichia coli*.

25 kg

Composición	
Formiato de Calcio	Lactato de Calcio
Propionato de Calcio	Excipientes
Ácido Fumárico	

Dosificación
Se administra vía oral mezclado homogéneamente con el alimento balanceado según la siguiente dosificación:
Gallinas Ponedoras con efecto bactericida: Mezclar homogéneamente 2 kg/t de alimento para la etapa preinicial y 3 kg/t de alimento para la etapa inicial.
Gallinas Reproductoras con efecto bactericida: Mezclar homogéneamente 3 kg/t de alimento para la etapa preinicial y 4 kg/t de alimento para la etapa inicial.
Aves en general como activador enzimático: Mezclar homogéneamente 1 kg/t de alimento para la etapa preinicial y 1,5 Kg/t de alimento para la etapa inicial.

CALCIFICANTES



Adishell

Mejorador de la calidad del huevo

Mejorador de calidad de huevo. Proporciona cáscaras más duras y reduce significativamente la cantidad de huevos rotos tanto en el oviducto como en la granja e incubadora. Además, extiende el período de postura y mejora la consistencia del albumen, asegurando mejores resultados productivos.

25 kg

Composición	
Fosfato dicalcico	Sulfato de Cobalto
Metionato de Zinc	Zinc Orgánico
Vitamina D3	Citrato de potasio
Manganeso orgánico	Sulfato de cobre
Sal	Citrato de sodio
Óxido de Magnesio	Sulfato de manganeso
Hierro Orgánico	

Dosificación
Ponedoras: 2 kg/t de alimento balanceado.
Reproductoras: 1,5 kg/t de alimento balanceado desde la fórmula de pico de postura hasta el final de la primera etapa de producción y 2 kg/t hasta el final del lote.



Calcioral G

Calcificante para aves

Calcificante diseñado para combatir el síndrome de fatiga de jaula en gallinas ponedoras enjauladas, favoreciendo una formación ósea adecuada y fortaleciendo el esqueleto para un mejor desempeño productivo.

25 kg

Composición	
Formiato de calcio	Vitamina D3
Citrato de calcio	Vitamina C
Lactato de calcio	Cobre Orgánico
Pidolato de calcio	Zinc Metionato
Ácido glutámico	Manganeso orgánico
Zeolita blanca	Fosfato monocalcico

Dosificación
Aves en inicio: 1 kg/t de alimento balanceado.
Aves en prepostura: Ponedoras 15 - 18 semanas: 2 kg/t de alimento balanceado. Reproductoras 20 - 23 semanas: 2kg/t de alimento balanceado.
Aves en postura: Ponedoras 19 - 32 semanas: 1 kg/t de alimento balanceado. Reproductoras 24 - 36 semanas: 1 kg/t de alimento balanceado.



ENZIMAS



Fullzyme

Compuesto multienzimático

25 kg

Es un refinado paquete de enzimas purificadas, diseñado específicamente para actuar sobre los polisacáridos no amiláceos (PNA) y reducir sus efectos antinutricionales. Basado en valoraciones matriciales de las dietas, aprovecha el aporte nutricional de cada enzima, que al interactuar con su sustrato específico, mejora significativamente el valor nutritivo de los alimentos.

Composición	
Celulasa	Proteasa
Pectinasa	Alfa amilasa
Xilanas	Dioxido de silicio
Beta glucanasa	Excipiente
Beta Mananasa	

Dosificación
Pollos y pollitas mezclar 300 g/t de alimento balanceado.
Gallinas postura mezclar 300 g/t de alimento balanceado.
Cerdos mezclar 300 g/t de alimento balanceado.



Soyzyme

Compuesto multienzimático para mejorar la asimilación de la soya

25 kg

Paquete multienzimático compuesto por enzimas exógenas provenientes de microorganismos no genéticamente modificados (NON GMO). Estas enzimas mejoran significativamente la digestibilidad de la dieta, especialmente en sustratos como la soya, beneficiando a aves, cerdos y otras especies animales.

Composición
Alfa Galactosidasa
Beta Mananasa
Excipientes

Dosificación
500 g/t de alimento balanceado.



Trigozyme

Complejo multienzimático para alimentos con trigo

25 kg

Complejo enzimático diseñado para optimizar la digestibilidad en dietas con alto contenido de trigo, favoreciendo una mejor asimilación de los nutrientes presentes en este cereal.

Composición
Xilanas
Beta Glucanasa
Excipiente

Dosificación
Se recomienda la utilización de TRIGOZYME en gallinas y cerdos.
500 g/t de alimento balanceado para gallinas.
500 g/t de alimento balanceado para cerdos.



FUNCIONALES



Adibiotic

Probióticos

Complejo de organismos vivos probióticos que, al administrarse a los animales, se activan en el intestino y, a las dosis recomendadas, modifican favorablemente la microbiota intestinal, promoviendo beneficios para la salud del huésped.

25 kg

Composición	
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Lactobacillus acidophilus</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	excipientes

Dosificación
Lechones y cerdas: 30 - 50 g/t de alimento balanceado.
Cerdos: 30 - 60 g/t de alimento balanceado.
Pollos y gallinas: 30 - 60 g/t de alimento balanceado.
Vacas lecheras: 250 - 500 g/t de alimento balanceado.



Enerbal

Emulsificante

Emulsificante que proporciona un precursor no glucosídico para la formación de nuevas moléculas de glucosa, estimulando la neoglucogénesis. Además, interviene en la glucogenólisis, liberando glucosa a partir del glucógeno almacenado. Estas funciones optimizan el uso de las reservas energéticas en el metabolismo diario, contribuyendo a un ahorro en los costos de formulación.

25 kg

Composición	
Glicerina	Cloruro de colina
Propanodiol	Di-propionato de amonio
Monoglicéridos	

Dosificación
Pollos de engorde de más de 23 días: 0,5 L/t.
Reproductoras pesadas y ponedoras, en fase de postura: 0,5 L/t.
Cerdos en ceba: 0,5 L/t.



Glucophos

Emulsificante de grasas

Emulsificante nutricional diseñado para mejorar la digestibilidad de grasas y ciertos almidones. Cuenta con un balance lipofílico-hidrofílico que facilita la disolución de grasas en agua, favoreciendo así la glucogénesis.

25 kg

Composición	
Lecitina de Soya	Cloruro de Colina
Betaina	Excipiente

Dosificación
Pollos de engorde: 0,5 - 1 kg/t.
Reproductoras pesadas y ponedoras: 0,5 kg/t.
Cerdos: 0,5 - 1 kg/t.



Liverkid

Hepatoprotector

25 kg

Mejora principalmente la función hepática, actuando como hepatoprotector, emulsificante, digestivo, antioxidante, prebiótico, colagogo, colerético, hipocolesterolemia, hipotrigliceridemia, inmunoestimulante y regenerador de hepatocitos. Está formulado para aves y cerdos bajo estrés, desórdenes metabólicos, problemas digestivos, intoxicaciones o inmunosupresión, con el objetivo de mejorar la salud del animal y sus parámetros productivos.

Composición	
Cloruro de colina	Silimarina
Maltodextrina	Betaina
Extracto de Cynara	

Dosificación
0,1 - 0,25 kg/t de alimento balanceado.



Promoter

Promotor de crecimiento

25 kg

Promotor de crecimiento no antibiótico que, gracias a su contenido de inmunoestimulantes, mejora la asimilación de nutrientes, favorece el desarrollo de los animales, refuerza el sistema inmunológico, optimiza la conversión alimenticia y reduce la mortalidad.

Composición	
Propionato de calcio	<i>Bacillus subtilis</i>
Formiato de calcio	<i>Lactobacillus acidophilus</i>
Ácido fumarico	Xilanas
Ácido cítrico	Alpha galactosidasa
Dioxido de Silicio	Almidón de maíz
Pared celular	Carbonato de calcio

Dosificación
PROMOTER se mezcla con el alimento del animal, según las siguientes dosis:
1 kg/t en alimentos para pollos, ponedoras, reproductoras y cerdos.
1 kg/t en alimentos para lechones.
1 kg/t en alimentos para cerdas.



Triplus

Mejorador de postura

25 kg

TRI-PLUS es un mejorador de postura que ayuda a incrementar la producción de huevos más allá de las curvas genéticas, además de mejorar la calidad del huevo.

Composición		
Maltodextrina	Butirato de sodio	Pectinase
Sulfato de magnesio	Carbonato de magnesio	Dioxido de silicio
Fosfato monosódico	Propilenglycol	Enzima Xilanase
Citrato de sodio	Carbonato de calcio	Enzima betaglucanase
Ácido cítrico	Almidón de maíz	Enzima betamanase
Sal	Cloruro de magnesio	Enzima fungal protease
Citrato de potasio	Citrato de calcio	Enzima alpha amilasa bacterial
Niacina	Cellulase	

Dosificación
Ponedoras en segunda y tercera etapa de postura: 2,5 kg/t de alimento balanceado.
Reproductoras: 2 kg/t de alimento balanceado desde la fórmula de pico de postura hasta el final de la primera etapa de producción. Y 2,5 kg/t hasta el final del lote.



Sanomax

Restaurador de la salud intestinal

Regulador de la salud intestinal compuesto por butirato de sodio libre y encapsulado, que a las dosis recomendadas protege las vellosidades del intestino delgado y grueso, promoviendo su elongación y aumento de grosor para maximizar el área de absorción de nutrientes.

25 kg

Composición		Dosificación
Butirato de Sodio	Propionato de Calcio	1 kg/t de alimento balanceado.
Fructooligosacáridos	Lactato de Calcio	

PIGMENTANTES



Adiphyll

Pigmentante natural para piel y patas en pollos

Producto a base de pigmentos naturales, que combina xantófilas amarillas del marigold (*Tagetes erecta*) y cantaxantinas rojas de la paprika (pimiento). Esta mezcla sinérgica, enriquecida con un antioxidante primario y un mineral orgánico, garantiza una pigmentación intensa y uniforme en patas y piel de pollos.

25 kg

Composición		Dosificación
Pigmento Amarillo (Xantófilas)	Dextrosa	Se indicará la cantidad de alimento necesario por especie y tipo de animal según los requerimientos. De acuerdo a la pigmentación del mercado y a la cantidad de maíz suministrado en la fórmula: 1 - 1,5 kg/t de alimento balanceado con maíz en pollos después de la fase inicial hasta el retiro de los animales; En ponedoras desde la etapa de pre-postura y durante las etapas de producción de huevo.
Pigmento Rojo (Cantaxantinas)	Dioxido de silicio	



Adiphyll Yolk

Pigmentante

Mezcla de pigmentos naturales y antioxidantes diseñada para lograr una pigmentación intensa, uniforme y estable en la yema del huevo.

25 kg

Composición		Dosificación
Pigmento Amarillo (Xantófilas)		Se recomienda la utilización de ADIPHYL YOLK únicamente para gallinas de postura. Se administra vía oral mezclado con el balanceado dependiendo de la cantidad de maíz suministrado en la fórmula sugerimos: En alimentos que contengan 20 % de maíz amarillo: 2,50 kg/t de alimento balanceado. En alimentos que contengan 40 % de maíz amarillo: 1,65 kg/t de alimento balanceado. En alimentos que contengan 60 % de maíz amarillo: 1 kg/t de alimento balanceado.
Excipiente		



ACIDIFICANTES



Acidif Forte

Acidificante

25 kg

Ayuda a mantener el nivel óptimo de acidez intestinal para una correcta actividad enzimática, facilitando la activación del pepsinógeno en pepsina, esencial para descomponer las proteínas durante la digestión. Además, al disminuir el pH intestinal, ejerce un efecto bacteriostático que favorece la proliferación de flora benéfica al reducir patógenos mediante exclusión competitiva.

Composición

Ácido Fumárico	Ácido Fosfórico
Ácido Cítrico	Excipiente

Dosificación

Se recomienda la utilización de ACIDIF FORTE para alimentos de lechones y cerdos en todas sus fases.
1 - 4 kg/t de alimento balanceado para cerdos y lechones.



 (+593-4) 210 3925

 info@adilisa.com

 Guayaquil - Ecuador

adilisa.com